

# پیلونفریت در حاملگی

در 2% از زنان حامله ایجاد می‌شود و یکی از شایع‌ترین عوارض طبّی حاملگی است که نیاز به بستری در بیمارستان دارد.

ناخوشی + تب + تندرns زاویه کوستوورترال + بی‌حالی + انقباضات رحمی (20% موارد)

درمان بعد از گرفتن نمونه برای کشت ادرار و آزمایش ادرار بصورت زیر انجام می‌شود:

در صورت زایمان  
پره ترم:  
توکولیتیک

داروی ضد تب در  
صورت تب بالا

آنتی‌بیوتیک: یک  
سفالوسپورین یا  
آمپی‌سیلین +  
جنتامایسین

هیدراسیون داخل  
وریدی

بزودی گزینه برتر زنان و زایمان بر اساس رفرانس جدید آزمون دستیاری یعنی بکمن منتشر می‌شود. می‌خواهیم در یک دوره کوتاه پانزده روزه در این پیج به مهمترین نکات این کتاب بپردازیم. با ما باشید. ممکن است در هر روز یک یا دو الگوریتم داشته باشیم. همراه باشید و اجازه بدهید در این مدت کوتاه بتوانیم بخشی از مطالب مهم زنان و زایمان را بر اساس رفرانس جدید مرور کنیم. آزمون‌های دوره‌ای پروانه دانش هم از آخر آذر شروع می‌شوند و نکات مهم تست‌های این آزمون‌ها هم می‌توانند برای شما مفید واقع شوند. سعی می‌کنیم الگوریتم‌های زنان را در کانال تلگرام پروانه دانش هم در اختیار شما قرار بدهیم. امروز نکته مهم ما مربوط به پیلونفریت در حاملگی می‌شود که بارها و بارها از درمان آن سوال آمده است.